


**Eugerres brasilianus**  
(Valenciennes, 1830)

**Caratinga**  
**Carapeba-Listrada**  
**Striped Mojarro**  
**Patao Rayado**



**Habitat e comportamento:** Como da Carapeba-branca. Costeiros, de estuários, lagoas e ao longo de costões, praias e baías. Sobre fundo de areia, cascalho ou lodo. Abundantes, formam grupos que ficam "farejando" o fundo em busca dos invertebrados bênticos que comem. A reprodução ocorre na mesma área, com os jovens se movimentando em cardumes na beira da praia.

**Diagnose:** D.IX,10; A.III,7; L.L.34-39; R.10-12 no ramo inferior; similar à carapeba branca mas com o segundo espinho do anal maior que a base do anal. Prateado com estrias escuras ao longo das séries longitudinais de escamas e dorso mais escuro, cinza e verde. Atinge até 40cm.

**Pesca e sabor:** Como da carapeba branca, porém sua carne é insípida. São fáceis de pescar com material fino e camarão descascado, ao longo de praias, canais e costões.

**Distribuição:** Atlântico ocidental, Belize ao Rio Grande do Sul.

**Outros Nomes:** Caratinga-riscada.

**Detalhe:** Espécie similar, *E. plumieri* (Valenciennes, 1830), está descrita apenas para o atlântico norte, da Carolina do Sul à Colômbia, e difere por possuir 13-17 rastros inferiores, geralmente 15.

*Bibliografia:*

*Carvalho, Filho, Alfredo de*  
*C321p*  
*Peixes da costa brasileira. São Paulo*  
*Ed Marca D'água, 1992.*  
*304p*

*Página 141*