


*Scomberomorus cavalla*  
(Cuvier, 1829)

**Cavala**  
**King Mackerel**  
**Carite**



**Habitat e comportamento:** da costa ao mar azul, da superfície a cerca de 80 metros de profundidade, na coluna d'água e pelágicos, mas não hesitam em se aproximar de costões, baías, enseadas; geralmente em pequenos grupos ou solitários quando bem desenvolvidos e em cardumes quando menores; na procriação formam gigantescos cardumes, buscando águas rasas para reproduzir, no verão, rumando para certas áreas, como o Norte do Caribe e Nordeste do Brasil, do Sul para o Norte. Ativos e vorazes, buscam alimento da superfície ao fundo, comendo desde Peixes-Voadores, Sardinhas, Agulhas, etc., a lulas, crustáceos bênticos, etc. São freqüentemente observados pelo mergulhador próximos a parcéis e nas pontas de ilhas e recifes. Preferem águas limpas e são diurnos.

**Diagnose:** DXVI a XVIII-1,15-16 + 8-9; A.II,15-16 + 7-9; R.8-1 1; corpo bastante alongado, pouco alto, moderadamente comprimido, elíptico em corte vertical; dorsais muito próximas; a região frontal de ambas mais alta; anal similar à segunda dorsal; peitoral maior que pélvica, mas ambas curtas; cabeça afilada, focinho cônico, pontudo; boca grande, ampla, com cerca de 32 dentes triangulares e afiados em cada maxilar; quilha mediana presente no pedúnculo caudal; corpo coberto por escamas, exceto nas peitorais; linha lateral faz curva abrupta para baixo sob a origem da segunda dorsal. Azul-escuro no dorso, branco prateado na região inferior; jovens com várias manchas redondas, amarelas a douradas, que escurecem rapidamente após a morte; região anterior da dorsal cinza, como o resto. Atinge até 1,7 metro e 45 kg.

Pesca e sabor: carne excelente, mas eventualmente tóxica, sela por Ciguatera, seja por sua rápida deterioração nas zonas tropicais. Tem grande importância comercial e esportiva, sendo capturado das mais diversas formas, até pelo seu variado habitat. No verão, lunto a ilhas, costões e recifes, cai em redes de espera, é pescado com arremessos de praia, costão e barco, em corrico, ancorado ou à deriva. A isca é variada, de peixe, vivo, morto ou em filets, a artificiais, de superfície ou meia-água, em corrico; os peixes maiores são espetaculares na pesca oceânica, onde o método de

pesca é o mesmo do Agulhão-Bandeira; os menores, mais comuns próximo à costa, podem ainda ser fígados com camarão vivo. A profundidade varia, da superfície a cerca de 50 metros, cada uma exigindo técnica diversa. Nas migrações de verão a pesca à deriva, o barco seguindo o enorme cardume, dá ótimos resultados, especialmente com isca artificial amarela ou branca, solta na corrente. Os dentes afiados exigem líder resistente. Luta com enorme vontade, principalmente à noite.

***Distribuição:*** Atlântico Ocidental, de Massachusefts a Santa Catarina.

***Outros nomes:*** Cavala-Perna-de-Moça, Cavala-Preta, Cavala-Sardinheira, Cavala-Verdadeira, Kingfish; Cabaña, Sierra, Sierra Conalera.

*Bibliografia:*

*Carvalho, Filho, Alfredo de  
C321p  
Peixes da costa brasileira. São Paulo  
Ed Marca D'água, 1992.  
304p  
Páginas 222-223*