


Oligoplites saliens
(Bloch, 1793)

Guaivira
Leatherjacket
Zapatero



Habitat e comportamento: costeiros, formam grandes cardumes ou grupos moderados, desde a superfície ao fundo, comendo peixes, lulas e crustáceos bênticos. Bastante comuns desde mangues (jovens) e estuários a baías, ao longo de praias e ao redor de ilhas, preferindo águas túrbidas às mais claras. Suportam muito bem grandes variações de salinidade e gostam de acompanhar as marés, que revolvem o fundo, buscando comida. Quando na superfície saltam fora da água, em perseguição a peixes menores. Os jovens são vistos flutuando na superfície, com a cabeça para baixo, lembrando folhas de mangue, em disfarce evidente, mesmo que não haja detritos na área. Pela presença comum de jovens em águas estuarinas e canais de mangues admite-se que sua reprodução ocorra em tais áreas e não em mar aberto, como acontece com muitas das demais espécies da família. Há relatos de que os jovens desta e das demais espécies do gênero se alimentam de escamas de peixes maiores.

Diagnose: D.IV-I,1 8-21; A.II-I,1 8-21; R.1 7-20 no ramo inferior do primeiro arco. Corpo alongado, estreito e comprimido, espinhos anteriores curtos, maiores e mais evidentes nos jovens; maxilares grandes e estreitos com uma única série de dentes no superior e com o perfil do inferior muito convexo, parte posterior da dorsal e anal formada por raios praticamente isolados, quase como pínulas escamas embebidas na pele, dando aparência muito macia à pele. Prateado; azul, preto ou verde no dorso; ventre e flancos freqüentemente dourados; cauda amarela. Atinge até cerca de 50 cm.

Pesca e sabor: sua carne é apreciada em alguns locais e desprezada em outros; é capturado comumente em arrastos de praia e em redes de espera próximas a costões mas não costuma ser freqüente no comércio, basicamente consumido por populações de beira-mar. A pesca esportiva pode oferecer bons momentos, com material leve, seja em corrico, com colheres e "plugs" de superfície pequenos, ou em arremesso de praia e linha de fundo, quando a isca preferida é o camarão; se um cardume começa a morder a quantidade pode ser impressionante e brigam bastante, embora por pouco tempo, chegando a dar saltos espetaculares.

Distribuição: Atlântico Ocidental, América Central (Honduras) ao Uruguai.

Outros nomes: Goivira, Solteira, Tibiro-Saltador; Castin Leatherjack; Quiebra, Saltador.

Bibliografia:

Carvalho, Filho, Alfredo de
C321p
Peixes da costa brasileira. São Paulo
Ed Marca D'água, 1992.
304p

Páginas 131-132